

ENFERMERÍA Y DOLOR EN LAS URGENCIAS PEDIÁTRICAS

Clara Isabel Montes Travieso¹

¹Enfermera. Hospital Campus de la Salud, Granada.

INTRODUCCIÓN:

El dolor en niños es uno de los motivos más frecuentes de consulta en las urgencias de pediatría, además, los procedimientos más usuales en estos servicios pueden provocar dolor en el niño. Los profesionales de enfermería que ejercen su labor en los servicios de urgencias pediátricas deben reconocer el grado y/o intensidad del dolor mediante el empleo correcto de las escalas de valoración de las que disponen para minimizarlo o reducirlo.

OBJETIVO:

Analizar la formación y actitud que tienen los profesionales de enfermería sobre las escalas de valoración del dolor en las urgencias de pediatría


METODOLOGÍA:

Se ha llevado a cabo un estudio observacional descriptivo de corte transversal mediante un cuestionario de carácter anónimo y voluntario haciendo referencia a nuestro objetivo de estudio. Se realizó durante los meses de agosto y septiembre del 2017. La muestra de estudio está compuesta por 55 profesionales sanitarios, concretamente enfermeros que ejercen su labor asistencial en las urgencias pediátricas en un hospital de la provincia de Granada.


RESULTADOS

Fueron encuestados 55 enfermeros (27% hombres y 73% mujeres) con edades comprendidas entre los 27 y 56 años, el 100% de ellos afirma conocer la existencia de escalas de valoración del dolor en pediatría.

¿Emplea en su trabajo las escalas de valoración del dolor en pediatría?



¿Ha recibido formación adicional en esta área?



El 100% de los profesionales sanitarios reconocen la importancia de saber emplear de forma correcta las escalas de valoración del dolor en pediatría, y la necesidad de formarse en esta área para que la atención al niño sea integral.

CONCLUSIONES:

Identificar el dolor y su intensidad en el paciente pediátrico es esencial para que el tratamiento elegido sea el adecuado. La formación y el uso en escalas de valoración del dolor pediátrico no es igual entre todos los profesionales de la salud, debido a esto, se debe fomentar la formación en esta área puesto que los enfermeros lo identifican como una necesidad y establecer protocolos de actuación para dar cuidados de calidad.

Ortells Abuje, N. Paguina Martos, M. y Marató Lorente, I. El nivel de triage en urgencias cambia según la escala de valoración del dolor utilizada. *Emergencias*. 2014; 26(4): 292-295.

Sellán Soto, M., Díaz Martínez, M., y Vázquez Sellán, A. Valoración del dolor y aplicación de intervenciones terapéuticas enfermeras en el paciente neonatal y pediátrico, en contextos asistenciales hospitalarios. *Revista Cubana de Enfermería*. 2012; 28(2): 144-155.