IDENTIFICACIÓN DE SIGNOS Y SÍNTOMAS ANTE UNA CRISIS ASMÁTICA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS PEDIÁTRICAS

AUTORAS: BERAZA N. (DUE); CARRANZA I. (DUE) OSI-BILBAO-BASURTO

INTRODUCCIÓN

El 10% de la población infantil en España sufre asma. Las crisis asmáticas suponen una causa importante de morbi-mortalidad en los pacientes pediátricos, además de un gran coste para el sistema sanitario y la economía familiar. Para disminuir su prevalencia es necesario identificar los signos y síntomas de forma adecuada y manejar los cuidados terapéuticos oportunos.

OBJETIVOS

Determinar los signos y síntomas de una crisis asmática en el Servicio de Urgencias de Pediatría y dar a conocer los cuidados terapéuticos según se clasifique la crisis en leve, moderada o grave.

EVALUACIÓN

Inicial

Triángulo Evaluación Pediátrica

Aspecto

Tono, interacción, mirada, lenguaje o llanto, si es consolable

Respiración

Signos de trabajo respiratorio, ruidos respiratorios anormales

Circulación

Color de la piel y signos de mala perfusión y shock

Primaria (ABCDE)

A: Permeabilidad de la vía aérea. Posición Fowler. Medir SatO₂

B: Valorar disnea: tos, aleteo nasal, trabajo respiratorio, tiraje subcostal-intercostal, dolor torácico

C: Color de piel y mucosas (cianosis, palidez), perfusión periférica. Medir T/A y FC

D: Valorar nivel de conciencia y pupilas

E: Tomar T° y valorar lesiones cutáneas asociadas

Secundaria (SAMPLE)

S: Síntomas respiratorios

A: Alergias conocidas

M: Medicamentos

P: Patologías previas

L: Última comida

E: Eventos que provocaron la crisis

Terciaria

Pruebas complementarias:

Analitica

Gasometría arterial/EAB

RX tórax

Síntomas asociados: vómitos, fiebre, obnubilación.

Signos de dificultad respiratoria: taquipnea, auscultación pulmonar con hipoventilación, sibilantes ins-espíricos, espiración alargada, subcrepitanes.

Signos de gravedad: prefieren estar sentados, están agitados, confusos o sudorosos, taquipnea importante, retracciones supraclaviculares, respiración lenta y dificultosa con mínimo movimiento del aire en la auscultación, estupor.

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

Salbutamol: fármaco de 1ª línea

Corticoide oral: Prednisona, Prednisolona, Dexametasona.

Bromuro de Ipratropio: indicado en crisis moderadas y graves.

Oxigenoterapia si SatO₂<94%

Corticoide IV: Dexametasona, Metilprednisolona

Sulfato de Magnesio: en crisis graves.

Adrenalina IM

OAF (Oxigenoterapia de Alto Flujo)

Nebulización con Heliox

IOT (Intubación Orotraqueal)

CONCLUSIONES

La divulgación de los conocimientos específicos entre el personal de enfermería, para una rápida evaluación del estado general y una actuación inmediata, conllevan a un mejor manejo de la crisis asmática evitando ingresos en planta o incluso en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos.