



II Congreso Virtual Internacional SEEUE

Actuación de enfermería en el área de Urgencias ante una herida por asta de toro.

Introducción Andalucía es una de las cuatro provincias españolas donde más corridas de toros se realizan, un 20,3 % según las Estadísticas de Asuntos Taurinos de 2011-2015. En el caso de la provincia de Jaén existe una extensa tradición taurina, y consecuentemente se producen cogidas por asta de toro en corridas y festejos populares. Por tanto, los enfermeros del servicio de Urgencias deben conocer la actuación y los cuidados a seguir ante esta situación, que puede llegar a ser de extrema gravedad.

Objetivo

Identificar la actuación y cuidados enfermeros ante una herida por asta de toro en el servicio de Urgencias.



Método

Realizamos un análisis del procedimiento y actuación enfermera en el servicio de Urgencias del Hospital San Juan de la Cruz en Úbeda, ya que pertenece a una zona de gran tradición taurina, y recibe en sus urgencias cogidas por asta de toro. Complementariamente, realizamos una revisión bibliográfica en las bases de datos Dialnet,



- 1) García Vacas, María (DUE y Antropóloga). Hospital San Juan de la Cruz (Úbeda).
- 2) Gallardo Pérez, Patricia (DUE). Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor (Murcia).
- 3) Ferre Vargas, Jessica (DUE). Clínica Diálisis Ntra Sra. De la Cabeza (Motril).

Resultados

Las heridas por asta de toro tienen connotaciones especiales; grandes destrozos tisulares, varios trayectos de lesión, y un alto grado de contaminación, debido a la inoculación masiva de gérmenes aerobios y anaerobios y la posibilidad de transmitir el tétanos.

En muchas ocasiones se produce una primera atención médica en la plaza de toros o en un hospital de campaña. Normalmente según la gravedad y evidencias físicas, se procede a su derivación hospitalaria.

Una vez que el paciente llega a **Urgencias** debemos;

- Realizar un reconocimiento sistemático del paciente, desnudándolo para que no pase desapercibido cualquier traumatismo o/y herida secundaria.
- Si existe traumatismo abdominal debe realizarse una ecografía y/o TAC abdominal.
- Debemos canalizar una vía venosa de gran calibre, en caso de pacientes que vengan en shock hipovolémico o hayan perdido gran cantidad de sangre, debemos canalizar dos vías venosas periféricas, y avisar rápidamente al cirujano de guardia.
- Analítica completa, incluidas pruebas cruzadas por si se necesita transfundir concentrados de hematíes.
- Pre-operatorio completo.
- Desinfección de la herida por asta de toro, es de gran importancia este punto, ya que este tipo de heridas tienen una alta tasa de infección. Debemos realizar un lavado de la herida minucioso con suero fisiológico y povidona yodada jabonosa.
- Vacunación antitetánica.
- Antibioterapia temprana, por el riesgo de infección.
- Administración de Clexane 40 mg SC o Bemiparina 3500 UI SC.

Conclusiones

Ante una cogida por asta de toro en Urgencias debemos seguir una serie de pasos y cuidados enfermeros, en colaboración con el equipo médico. Este tipo de heridas tienen características especiales, alto grado de contaminación y direccionalidad de la cornada que puede destruir tejido tisular y otras estructuras aledañas. Debemos realizar un reconocimiento físico completo del paciente, un lavado y desinfección de la herida, y una administración de antibioterapia, vacuna antitetánica, y heparina sódica.